

CARBODAL® 5%

Carbocystéine
Solution buvable

COMPOSITION :

Substance active : Carbocystéine.....5 g/100 ml

Excipients : Hydroxyde sodique, propylène glycol, hydroxyéthylcellulose, saccharine sodique, parahydroxybenzoate de méthyl sodé, parahydroxybenzoate de propyl sodé, colorant rouge ponceau E124, arôme de fraise, eau purifiée.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Sodium, parahydroxybenzoate de méthyl sodé, parahydroxybenzoate de propyl sodé, colorant rouge ponceau E124.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION :

Solution buvable; flacon de 125 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Mucolytique- expectorant

INDICATIONS :

Ce médicament fluidifie les sécrétions (mucosités) présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation par la toux (expectoration).

Ce médicament est réservé à l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans.

Il est utilisé en cas de toux grasse récente avec difficulté à expectorer.

POSOLOGIE / MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie

-La dose habituelle est de 1 cuillère à soupe (15 ml) 3 fois par jour (matin, midi et soir), en dehors des repas.

-1 cuillère à soupe de 15 ml contient 750 mg de carbocystéine.

-Si vous suivez un régime sans sucre ou pauvre en sucre, ce médicament est adapté à votre régime.

Mode d'administration

Voie orale

Durée du traitement

Ne dépasse pas 5 jours de traitement. Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours de traitement.

CONTRE INDICATIONS :

Ne prenez jamais CARBODAL 5% :

-Si vous êtes allergique à la carbocystéine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (notamment aux parahydroxybenzoates).

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Vous ne devez pas utiliser de médicaments qui empêchent la toux (antitussifs) ou qui assèchent les sécrétions bronchiques quand vous prenez CARBODAL 5%. En effet, ce médicament fluidifie les sécrétions, ce qui facilite leur évacuation par la toux. La toux est utile pour expectorer.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CARBODAL 5% :

- Si vous avez de la fièvre ou si votre expectoration est « verdâtre ».
 - Si vous souffrez d'une maladie chronique des bronches ou des poumons.
 - Si vous avez un ulcère digestif (de l'estomac ou de l'intestin).
 - Chez les sujets âgés.
 - En cas d'administration concomitante avec des médicaments susceptibles de provoquer des saignements de l'estomac ou de l'intestin.
- Ce médicament contient du sodium. Vous devez en tenir compte si vous suivez un régime sans sel ou pauvre en sel.
- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyl sodé et du parahydroxybenzoate de propyl sodé et peut provoquer des réactions allergiques.

- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E124) et peut provoquer des réactions allergiques.

ADRESSEZ VOUS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CE MEDICAMENT

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Ce médicament contient de la carbocystéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses recommandées.

PREVENIR VOTRE MEDECIN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS D'AUTRES MEDICAMENTS.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

EFFETS INDESIRABLES:

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Troubles digestifs tels que douleurs d'estomac, nausées, vomissements, diarrhées. Il est alors conseillé de réduire la posologie.

- Saignements de l'estomac ou de l'intestin. Le traitement doit être arrêté.

- Réactions cutanées allergiques telles qu'urticaire, démangeaison, éruption de plaques ou de boutons sur la peau, gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer et mettre en danger le patient (œdème de Quincke). Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

- Éruption de plaques brunes ou violacées pouvant laisser une coloration sur la peau (érythème pigmenté fixe). Dans ce cas, vous devez consulter immédiatement votre médecin.

- Éruption de boutons avec parfois des bulles sur la peau pouvant aussi affecter la bouche (érythème polymorphe), éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (Syndrome de Stevens-Johnson).

SURDOSAGE :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée des enfants.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Juin 2018

DE N°: 18/07/20D042/318

FABRICANT, CONDITIONNEUR ET DETENTEUR DE LA DE:

Laboratoires PHARMIDAL NS

144, Z.1 le RHUMEL Constantine ALGERIE

Tél./Fax : 031 60 65 53/031 60 65 52

كاربودال®5%

كاربوسيسيتين

محلول للشرب

التركيب:

المادة الفعالة: كاربوسيسيتين.....5غ/100مل

سواغات: هيدروكسيد الصوديوم، برويلان غليكول، هيدروكسي إيثيل سلولوز، ساكرين صوديوم، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات صوديوم، بروبييل باراهيدروكسي بنزوات صوديوم، ملون أحمر قرمزي E124 ، نكهة الفراولة، ماء منقى.

سواغات ذات تأثير معلوم:

ميثيل باراهيدروكسي بنزوات صوديوم، بروبييل باراهيدروكسي بنزوات صوديوم، ملون أحمر قرمزي E124

الشكل الصيدلاني و العرض :

محلول للشرب: عبوة ذات 125 مل.

الصفن الدوائي العلاجي:

محلل مخاطي- مقشع (طارد البلغم)

دواعي الإستعمال :

هذا الدواء يميع الإفرازات (البلغم) الموجودة في القصبات الهوائية. و بذلك يسهل طرد البلغم عن طريق السعال (تقشع).

هذا الدواء مخصص للبالغين و المراهقين الذين يفوق سنهم 15 سنة

يتم استخدامه في حالة السعال الدهني الحديث مع صعوبة في التقشع (طرد البلغم).

الجرعة/ طريقة الإستعمال:

الجرعة:

- الجرعة المعتادة هي 1 ملعقة طعام كبيرة (15 مل) 3 مرات في اليوم (صباح، ظهر و مساء) خارج وجبات الطعام

1- 1 ملعقة طعام كبيرة ذات 15 مل تحتوي على 750 مغ من الكاربوسيسيتين.

- إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر أو قليل السكر ، فهذا الدواء مناسب لنظامك الغذائي

طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم

لا تتجاوز 5 أيام من العلاج، استشر طبيبك إذا ساءت الأعراض أو استمرت بعد 5 أيام من العلاج

موانع الإستعمال:

لا تتناول أبداً كاربودال®5%:

إذا كان لديك حساسية من الكاربوسيسيتين أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (خاصة باراهيدروكسي بنزوات)

التحذيرات و احتياطات الإستعمال :

يجب عدم استخدام الأدوية التي تمنع السعال (مضادات السعال) أو تجفف إفرازات القصبات الهوائية عند تناول كاربودال. في الواقع، هذا الدواء يميع الإفرازات ، مما يسهل إخراجهم عن طريق السعال. السعال مفيد للتقشع (طرد البلغم).

• تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ كاربودال®5%

• إذا كنت تعاني من الحمى أو إذا كان البلغم «مخضر»

• إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الشعب الهوائية أو الرئتين

• إذا كان لديك قرحة في الجهاز الهضمي (المعدة أو الأمعاء)

• لدى كبار السن

• في حالة تناول هذا الدواء مع أدوية أخرى قد تسبب النزيف في المعدة أو الأمعاء

- هذا الدواء يحتوي على الصوديوم. يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار إذا كنت تتابع نظام غذائي خالٍ من الملح أو قليل الملح.

- يحتوي هذا الدواء على ميثيل باراهيدروكسي بنزوات الصوديوم و بروبييل باراهيدروكسي بنزوات الصوديوم وقد يسبب الحساسية.

- يحتوي هذا الدواء على عامل تلوين أزوتي (E124) وقد يسبب تفاعلات حساسية.

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

التداخلات الدوائية:

يحتوي هذا الدواء على الكاربوسيسيتين. قد تحتوي أدوية أخرى عليه. لا تجمع بينها، حتى لا تتجاوز الجرعات الموصى بها.

أعلم طبيبك حول ما إذا كنت تتناول أو تناولت أدوية أخرى.

الحمل و الإرضاع:

الحمل:

لا يستخدم هذا الدواء أثناء الحمل إلا بناء على نصيحة طبيبك.

إذا اكتشفت أنك حامل أثناء العلاج، استشري طبيبك لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يقرر ضرورة الإستمرار في تناوله.

الإرضاع:

من الممكن إرضاع طفلك إذا كنت تعالجن بهذا الدواء

استشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء

التأثيرات الغير مرغوب فيها :

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، لكنها لا تحدث بالضرورة للجميع.

- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة ، الغثيان، القيء، الإسهال. من المستحسن عندئذٍ تقليل الجرعة - نزيف في المعدة أو الأمعاء. يجب إيقاف العلاج.

- تفاعلات حساسية جلدية مثل شرى، حكة، طفح جلدي بقع أو بثور على الجلد، تورم الوجه و / أو الرقبة ممكن أن تسبب في صعوبة في التنفس و تعريض المريض للخطر (وذمة كوينك). في هذه الحالة، يجب إيقاف العلاج و استشارة الطبيب على الفور.

- ظهور بقع بنية أو أرجوانية قد ترك لوقتاً طويلاً على الجلد (حمامي مصطبغ). في هذه الحالة، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور.

- طفح البثور مع قشاعات على الجلد يمكن أن تؤثر أيضاً على الفم (حمامي عديدة الأشكال) ، طفح قشاعات مع انفصال عن الجلد الذي يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم و يعرض المريض للخطر (متلازمة ستيفنز جونسون).

جرعة زائدة:

استشر طبيبك أو الصيدلي على الفور

شروط حفظ الدواء:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م

لا يترك في متناول الأطفال .

تاريخ مراجعة نشرة الإرشادات: جوان 2018

مقرر التسجيل رقم : 18/07/20D042/318

مصنع و صاحب مقرر التسجيل:

مخابر فارميدال ن.س

144، المنطقة الصناعية الرمال قسنطينة الجزائر .

الهاتف/ الفاكس: 031 60 65 53/ 031 60 65 52