

FLUVERDAL® 2%

Flubendazole

Suspension buvable

COMPOSITION :

Substance active : Flubendazole.....2 g/100 ml

Excipients : parahydroxybenzoate de méthyle sodique, sodium lauryl sulfate, carbo-pol 974P, saccharose, hydroxyde de sodium, arôme banane, eau purifiée.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

parahydroxybenzoate de méthyle sodique, saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Suspension buvable : flacon de 30 ml muni d'un gobelet doseur.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE: ANTIHELMINTHIQUES.

INDICATIONS :

FLUVERDAL est utilisé pour le traitement des infestations par certains vers parasites du tube digestif: oxyure, ascaris, trichocéphale, ankylostome.

POSOLOGIE / MODE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien.

Posologie

La dose recommandée est identique chez l'enfant et chez l'adulte. Elle dépend du ver infestant :

· Oxyure: 5 ml en prise unique. La prise sera renouvelée 15 à 20 jours plus tard afin d'éliminer totalement toute infestation.

Des mesures d'hygiène rigoureuses corporelles (nettoyage des ongles, etc...) et vestimentaires doivent accompagner le traitement pour éliminer le risque de ré-infestation.

· Ascaris, trichocéphalose, ankylostomiase: 5 ml matin et soir pendant 3 jours.

Mode d'administration

Voie orale.

Ni purge, ni jeûne préalable ne sont nécessaires. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime alimentaire particulier pendant le traitement.

Bien agiter la suspension buvable avant l'emploi. Mesurer à l'aide du gobelet doseur présent dans la boîte.

Utilisation chez les enfants

Ne pas utiliser chez les enfants de moins d'un an sans avis médical.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais FLUVERDAL :

· si vous êtes allergique au flubendazole ou à l'un des autres composants contenus

dans ce médicament.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E219) et peut provoquer des réactions allergiques.

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Enfants: Ne pas utiliser chez les enfants de moins d'un an sans avis médical.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous devriez consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Le flubendazole ne devrait être administré aux femmes enceintes ou qui allaitent que s'il est prescrit par un médecin.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES :

Ce médicament peut occasionner des vertiges chez certaines personnes. Si tel est votre cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

EFFETS INDESIRABLES

- **Fréquent (moins de 1 patient sur 10) :** Douleur abdominale, diarrhée, céphalées.

- **Peu fréquent (moins de 1 patient sur 100) :** Nausées, vomissements vertiges.

- **Rare (moins de 1 patient sur 1000) :** Réactions allergiques à type d'urticaire, éruption cutanée, gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), déman-gaisons.

SURDOSAGE :

Si vous avez pris accidentellement une trop grande quantité de FLUVERDAL, consultez immédiatement votre médecin, par mesure de sécurité.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas conserver au-delà de 3 mois après première ouverture du flacon.

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Octobre 2019.

DE N° : 19/19B005/318

FABRICANT, CONDITIONNEUR ET DETENTEUR DE LA DE :

Laboratoires PHARMIDAL NS

144, Z.I Le RHUMEL Constantine - ALGERIE

Tél. /Fax : 031 60 65 53/031 60 65 52

فلوفاردال® 2 % فلوباندازول معلق للشرب

التركيب: المادة الفعالة:

فلوباندازول.....2غ/100مل

سواغات : باراهيدروكسي بنزوات ميثيل الصوديوم، صوديوم لوريل سولفات، كاربوبول 974P، ساكاروز، هيدروكسيد الصوديوم، عطر الموز، ماء منقى.

سواغات ذات تأثير معلوم:

باراهيدروكسي بنزوات ميثيل الصوديوم ، ساكاروز.

الشكل الصيدلاني و العرض :

معلق للشرب: عبوة ذات 30 مل مزودة بمقياس الجرعات.

الصفى الدوائى العلاجي: مضاد الطفيليات .

دواعي الإستعمال :

يوصف فلوفاردال لعلاج الإتهابات التي تسببها بعض الديدان الطفيلية في الجهاز الهضمي: الدبوسية، الدودة المستديرة، الدودة السوطية، الشصية.

الجرعة / طريقة الإستعمال:

تناول دائما هذا الدواء تماما كما هو موضح في هذه النشرة أو حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة

الجرعة الموصى بها هي نفسها لدى الأطفال و البالغين. تعتمد الجرعة على نوع الدودة التي تصاب بها.

• الدبوسية: 5 مل على جرعة واحدة. تجدد الجرعة بعد 15 إلى 20 يوما من أجل القضاء نهائيا على أي عدوى.

يجب مراقبة العلاج بتدابير صحية صارمة خاصة بالجسم (تنظيف الأظافر، وما إلى ذلك) و الملابس لتجنب عودة العدوى.

• الدودة المستديرة ، التهابات الدودة السوطية، الشصية: 5 مل صباحا و مساء لمدة 3 أيام.

طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم

لا يستلزم الصيام مسبقا. ليست هناك حاجة لاتباع نظام غذائي خاص خلال فترة العلاج. رج العبوة جيدا قبل الإستخدام. استعمل مقياس الجرعات الموجود داخل العبوة.

الإستعمال لدى الأطفال

لا يستعمل لدى الأطفال الأقل من عام دون استشارة الطبيب.

موانع الاستعمال:

لا تتناول فلوفاردال :

إذا كنت تعاني من حساسية من فلوباندازول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

التحذيرات و احتياطات الإستعمال:

- يحتوي هذا الدواء على باراهيدروكسي ميثيل الصوديوم (E219) وقد يسبب الحساسية.

- لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز، متلازمة سوء امتصاص الجلوكوز و الجالاكتوز أو نقص في سوكرز/ إيزومالتاز(أمراض وراثية نادرة).

الأطفال: لا يستعمل لدى الأطفال الأقل من عام دون استشارة الطبيب.

التدخلات الدوائية:

لتجنب تفاعلات محتملة بين عدة أدوية، يجب إعلام طبيبك أو الصيدلي عن أي علاج آخر يؤخذ في آن واحد.

الحمل و الإرضاع:

إذا كنت حاملا أو ترضعين، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

يجب ألا يعطى فلوباندازول للنساء الحوامل أو المرضعات إلا إذا وصفه الطبيب.

الأثر على القدرة على سيطرة المركبات و استعمال الآلات:

يمكن أن يسبب هذا الدواء دوخة لدى بعض الأشخاص. في هاته الحالة، يجب عدم سيطرة المركبات أو إستعمال الآلات.

التأثيرات الغير مرغوب فيها:

منتشرة (أقل من 1 من كل 10 مرضى): ألم في البطن، إسهال، صداع

قليلة الإنتشار (أقل من 1 من كل 100 مريض): غثيان ، قيء، دوخة

نادرة (أقل من 1 في 1000 مريض): حساسية مثل شرى، طفح جلدي ، تورم في الوجه و الرقبة (وذمة كوينك) ، حكة.

جرعة زائدة:

إذا تناولت عن طريق الخطأ كمية كبيرة من فلوفاردال، استشر طبيبك فوراً لإجراء وقيائي.

شروط حفظ الدواء:

لا يترك في متناول الأطفال.

لا يستعمل بعد ثلاثة أشهر من فتح العبوة.

تاريخ مراجعة نشرة الإرشادات: أكتوبر 2019

مقرر التسجيل رقم : 19/19B005/318

مصنع و صاحب مقرر التسجيل:

مخابر فارميدال ن.س

144، المنطقة الصناعية الرمال قسنطينة - الجزائر.

الهاتف/ الفاكس : 031 60 65 53/031 60 65 52